

Resolver el sistema de ecuaciones de dos incógnitas usando el método de gauss jordan

## Resolver X Gauss Jordan

$$\begin{cases} -3x - 2y = 5 \\ -2x - 3y = -1 \end{cases}$$

---

### Solución del ejercicio

Ya es sabido que la solución de un problema de ecuaciones puede llevarse a cabo a través de diferentes formas: el uso de matrices facilita este proceso. La solución de ecuaciones a través del álgebra de matrices se realiza gracias a la implementación de ecuaciones matriciales.

Las operaciones elementales a una matriz son de intercambio de filas, operación producto escalar por fila, producto escalar por fila y suma a otra fila, suma o resta de filas.

El método de gauss jordan consiste en crear la matriz aumentada entre la matriz original y los valores numéricos independientes de la ecuación y de llevar la matriz original a matriz identidad a través de operaciones de reducción entre renglones; es decir, la matriz de la izquierda de la matriz aumentada deberá terminar como la matriz identidad y los valores de cada variable del lado derecho con los que se aumentó la matriz serán los valores respectivos de cada incógnita.

### Propiedades:

- Si al terminar de reducir la matriz aumentada se obtiene que toda una fila está compuesta por ceros entonces, la ecuación tendrá infinitas soluciones.
- Si al terminar de reducir la matriz aumentada se obtiene que toda una fila excepto el valor aumentado son todos cero, entonces la ecuación no tendrá solución, será una ecuación indeterminada.

$$\begin{cases} -3x - 2y = 5 \\ -2x - 3y = -1 \end{cases}$$

$$\left[ \begin{array}{cc|c} -3 & -2 & 5 \\ -2 & -3 & -1 \end{array} \right] \text{ Matriz Aumentada}$$

$$\left[ \begin{array}{cc|c} -3 & -2 & 5 \\ -2 & -3 & -1 \end{array} \right] \text{ Mf1}(-1/3)$$

$$\left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 2/3 & -5/3 \\ -2 & -3 & -1 \end{array} \right] \text{ Mf1}(2)+f2$$

$$\left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 2/3 & -5/3 \\ 0 & -5/3 & -13/3 \end{array} \right] \text{ Mf2}(-3/5)$$

$$\left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 2/3 & -5/3 \\ 0 & 1 & 13/5 \end{array} \right] \text{ Mf2}(-2/3)+f1$$

$$\left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -51/15 \\ 0 & 1 & 13/5 \end{array} \right]$$

Como resultado final se puede concluir que la incógnita  $x = -51/15$ ;  $y = 13/5$

Se puede verificar esto comprobando dichos valores en la ecuación original.

#### Convenciones:

**Mfx( valor ):** Multiplicar la fila x por un valor

**Mfx( valor ) + filax2 :** Multiplicar la fila x por un valor y sumarlo a la filax2

**fx ↔ fx2:** Intercambiar la fila x con la fila x2